

Samenvatting van De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) COVID werkgroep en RIVM 6-1-2022

- Er is een schema van de vaccinatietrajecten bij deze patiëntengroepen en tijdslijnen opgenomen voor de basisserie/primaire vaccinaties en booster dosis. De basisserie bestaat uit 2 standaard vaccinaties met additioneel een 3^e prik bij een geselecteerde groep ernstig-immuungecompromitteerde patiënten om de primaire respons zo goed mogelijk op peil te brengen.
- Een booster dosis is van toepassing op iedereen na de basis serie minimaal 3 maanden na de laatste vaccindosis; dat kan na een basisserie van 2 vaccindoses zijn of na de extra 3^e vaccinatie die een deel van deze personen heeft ontvangen vanaf eind oktober 2021. De booster kan vanwege de nu circulerende Omikronvariant al na een interval van minimaal 3 maanden gegeven worden om antistoftiters waar mogelijk te verhogen. Een langer interval is immunologisch gezien beter.
- Het 3^e priktraject bij de GGD voor de basisserie bij ernstig immuungecompromitteerde patiënten loopt tot 31 januari 2022. Hiervoor ontvangt een patiënt een uitnodiging van de behandelend specialist/ziekenhuis.
- Vanaf medio januari 2022 is er de mogelijkheid voor een geïndividualiseerd beleid in de ziekenhuizen voor immuungecompromitteerde patiënten. Er komen dan vaccins beschikbaar in de apotheek van de ziekenhuizen. Specialisten kunnen de indicatie stellen voor een additionele vaccindosis of eventueel een hele nieuwe basisserie voor individuele patiënten (b.v. na allogene stamceltransplantatie vanwege verlies van eerder verkregen immuniteit). De vaccinatie(s) wordt/worden uitgevoerd en geregistreerd in het ziekenhuis, waarna een link komt met het landelijke registratiesysteem.
- Op dit moment is bij de GGD alléén het traject lopend voor een additionele derde prik of een booster 3 maanden na de laatste vaccinatie. Er is géén traject opgezet voor patiënten(groepen), die buiten de standaardaanbevelingen voor basisserie/3^e prik/boostervaccinatie nog een 4^e vaccinatie (b.v. volledige dosis Moderna vaccin binnen 3 maanden na de 3^e vaccindosis) of meer additionele vaccinaties nodig zouden hebben op indicatie van een behandelend specialist. Dit kan dus vanaf medio januari in het ziekenhuis zelf.
- Er is geen consensus over een specifieke laboratoriumtest of een specifieke uitslag/antistoftiter of een afkappunt (correlaat van bescherming) op grond waarvan men kan aangeven of additionele vaccinaties (3^e, 4^e of boostervaccin) wel of niet nodig zijn.
- Ringvaccinatie van alle huishoudcontacten van 5 jaar en ouder wordt mogelijk zodra gezonde kinderen van 5-11 jaar aan de beurt zijn, waarschijnlijk vanaf medio januari.